

Acharya Nagarjuna University (Test No. 13)

Sl. No. : 130009

P.G. ENTRANCE TEST, MAY 2013.

Test Name : STATISTICS

HALL TICKET No. :

--	--	--	--	--	--	--

Signature of the Candidate

Signature of the Invigilator

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

This question paper booklet consists of THREE Sections A, B and C. Sections A and B contain 30 multiple choice questions each. Section C contain 40 Multiple choice questions.

Clearly write your Hall Ticket Number in the space provided on the question paper booklet (if necessary on the OMR answer sheet) without corrections or overwriting. If any correction is made, get it certified by the invigilator.

You are prohibited from writing your name or Hall Ticket No. on any part of the Question paper booklet or on the OMR answer sheet except in the space provided.

No paper should be detached from the question paper booklet and it should be returned to the invigilator along with the OMR answer sheet.

You are supplied with OMR answer sheet for answering the questions.

Before you start answering, please read the instructions given in the OMR answer sheet.

Do not foul/mutilate/scribble the OMR answer sheet.

For answering the questions darken the appropriate circle completely with HB pencil only.

If you wish to change your answer, erase already darkened circle and then darken the appropriate circle.

Do not make any stray marks/scribble on the bar code of the OMR answer sheet.

Any rough work should be done in the space provided at the end of the question paper booklet.

(Test No. 13)

Test Name : STATISTICS

Time : 90 minutes

Maximum : 100 marks

Answer ALL questions.

Each question carries ONE mark.

SECTION A

1. This graph gives accurate picture of the relative proportions of frequency from interval to interval

ఈ రేఖా చిత్రము పొనఃపుస్యలో యొక్క సాపేక్ష అనుపాతములు అంతరము నుండి అంతరముకు కల్పితమైన వర్షన ఇచ్చును

(a) Frequency polygon

(b) Histogram

పొనఃపుస్య క్రమ భుజి

పొనఃపుస్య సాపాన చిత్రము

(c) Frequency curve

(d) Ogive curve

పొనఃపుస్య వక్రము

ఓజివ్ వక్రము

2. The mean of 68 numbers is 18. If each numbers is divided by 6, the new mean is

68 సంఖ్యల యొక్క అంకుధ్వము 18. ప్రతి సంఖ్యను 6 చేత భాగించగా కొత్త అంకుధ్వములు ఇది

(a) 108

(b) 24

(c) 3

(d) 74

3. The sum of deviation of a set of values x_1, x_2, \dots, x_n measured from 50 is -10 and the sum of deviation of values from 46 is 70. The value of n is

ఒక సమితి x_1, x_2, \dots, x_n యొక్క విలువలు 50 నుంచి విచలనము గట్టించగా వాటి యొక్క మొత్తము -10 మరియు విలువల యొక్క విచలనము 46 నుంచి గట్టించగా వాటి యొక్క మొత్తము 70. n యొక్క విలువ ఇది

(a) 80

(b) 20

(c) 4

(d) 15

4. An appropriate measure of central tendency for open interval is

వివృతాంతరముకు సరియైన కెంద్రియ ప్రవృత్తి మానము ఇది

(a) Mode

(b) Mean

బహుభక్తము

అంకుధ్వము

(c) Geometric mean

(d) Median

గుణమధ్యము

మధ్యగతము

5. The best measure of comparing the variability of the two series

రెండు స్రేణీల యొక్క విచరణము సరిపోల్చుటకు అత్యుత్తమ మాపనము

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) Variance
విస్తృతి | (b) Range
రేంజి |
| (c) Mean deviation
మధ్యము విచలనము | (d) Coefficient of variance
విచలనాంకము |

6. Mode = 3 Median – 2 Mean holds if the distribution is

వభాజనము ఇది అయితే, బాహుళకము = 3 మధ్యగతము – 2 అంకమధ్యము ఉండుంది

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (a) Moderately skewed
మితముగ అసమతల | (b) Positively skewed
ధనాత్మక అసమతల |
| (c) Discrete
విచ్ఛిన్నము | (d) Continuous
ఆవిచ్ఛిన్నము |

7. $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$ and $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, then A and B are

$P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$ మరియు $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ అప్పుడు A మరియు B లు

- | | |
|--|--|
| (a) Independent
స్వతంత్రము | (b) Complementary
శూరకము |
| (c) Not independent
స్వతంత్రము కావు | (d) Mutually exclusive
పరస్పర వియుక్తము |

8. This theorem is based on the concept that probabilities showed revised when some new information is available

క్రొత్త సమాచారము ప్రయోజనకారిగ ఉన్నప్పుడు సంభావ్యతలు మరల తిరిగి చూడవలేననే భావన మీద ఈ సిద్ధాంతము ఆధారపడినది

- | | |
|---|--|
| (a) Addition theorem
సంకలన సిద్ధాంతము | (b) Bayes' theorem
బేయిస్ సిద్ధాంతము |
| (c) Multiplication theorem
గుణన సిద్ధాంతము | (d) Theorem on variance
విస్తృతి మీద సిద్ధాంతము |

9. Five men in a company of 20 are graduates. If 3 men are picked out of the 20 at random, the probability of at least one graduate is

20 మందిలో 5గురు పురుషులు గ్రాడ్యూయేట్స్. 20 మంది నుండి యాదృచ్ఛికముగా ముగ్గురు పురుషులను తీసుకొనిన కనీసము ఒక గ్రాడ్యూయేట్ ఉండే సంభావ్యత

- | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (a) $\frac{1}{114}$ | (b) $\frac{91}{228}$ | (c) $\frac{137}{228}$ | (d) $\frac{1}{228}$ |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|

10. A random variable X has the following probability distribution

X అనే యాదృచ్ఛిక చలరాశి దిగువ సంభావ్యతా విభాజనము కలిగి ఉన్నది:

Value of X

X ఎమ్కు విలువ : 0 1 2 3

$$P(X = x) \quad : \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{6}$$

$$E(2X - 1) =$$

11. A random variable X has the following p.d.f.

X యాదృచ్ఛిక చలరాశి దిగువ సం.సాం.ప్ర. కలికనది.

$$f(x) = 12x^3 - 21x^2 + 10x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$= 0 \quad \text{otherwise}$$

ఇతర్తు

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) =$$

- (a) $\frac{7}{16}$ (b) $\frac{9}{16}$ (c) $\frac{1}{16}$ (d) 1

12. A continuous random variable X has the distribution function.

X అనే అవిచ్చిన్న యాదృచ్ఛక చలరాశి రిగువ విభాజన ప్రమేయము కలిగి ఉన్నది.

$$F(x) = 0 \quad ; \quad x \leq 1$$

$$= K(x-1)^4 \ ; \ 1 < x \leq 3$$

$$= \quad 1 \quad ; \quad x \geq 3$$

Then $K =$

అవ్యాధి

- (a) $\frac{5}{32}$ (b) 1 (c) $\frac{1}{16}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{16}}$

13. The joint p.d.f. of X_1 and X_2 is

X_1 మరియు X_2 యొక్క సంయుక్త సం.సాం.వ్.

$$p(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}; \quad x_1 = 1, 2, 3; \quad x_2 = 1, 2$$

$$= 0, \text{ otherwise}$$

ఇతరంగా

Marginal p.d.f. of X_2 is

X_2 యొక్క ఉపాంత సం.సాం.వ్. ఇది

- (a) $\frac{6+3x_2}{21}$ (b) $\frac{2x_1+3}{21}$ (c) $\frac{3+3x_2}{21}$ (d) $\frac{3+6x_2}{21}$

14. If the random variable X has the distribution function $F(x)$ then the p.d.f. of X^3 is

X యార్డుచ్చిక చలరాశి యొక్క విభాజన ప్రమేయము $F(x)$ అయితే X^3 యొక్క సం.సాం.వ్.

ఇది :

- (a) $\frac{1}{3}f(x^{1/3}) \cdot \frac{1}{x^{2/3}}$ (b) $f(x^{1/3}) \cdot \frac{1}{x^{2/3}}$
 (c) $\frac{1}{3}f(x^{2/3}) \cdot \frac{1}{x^{1/3}}$ (d) $\frac{2}{3}f(x^{1/3}) \cdot \frac{1}{x^{2/3}}$

15. If the moment of order t exists for a random variable then moments of this order exist for s , where

ఒక యార్డుచ్చిక చలరాశికు ఒక క్రమము ఘరాతిక ఉన్నట్లయితే, తాపి ఈ క్రమము యొక్క ఘరాతికలు ఉంటాయి

- (a) $0 < t < s$ (b) $0 < s < t$ (c) $0 < s < t - 1$ (d) $0 < s \leq t - 1$

16. If $E(X^2) < \infty$, then $V(X) = V(E(X/Y))$ if and only if

$E(X^2) < \infty$ అయితే ఇది అయినప్పుడు మాత్రమే $V(X) = V(E(X/Y))$

- (a) Y is a function of X (b) X is a function of Y

Y అనేది X యొక్క ప్రమేయము X అనేది Y యొక్క ప్రమేయము

- (c) $X = E(Y/X)$ (d) $V(X) = V(Y)$

17. This function uniquely determines the distribution function

ఈ ప్రమేయము విభాజన ప్రమేయమును ఏకైకంగా నిర్దయిస్తుంది

(a) Probability generating function

సంభావ్యత జనక ప్రమేయము

(b) Moment generating function

ఘర్షికోత్సాధన ప్రమేయము

(c) Cumulant generating function

క్యమ్యులాంటు ఉత్పాదిక ప్రమేయము

(d) Characteristic function

లాక్షణిక ప్రమేయము

18. If the distribution function of a random variable X is symmetrical about zero then the characteristic function is

X యొద్దుల్నిక చలరాశి యొక్క విభాజన ప్రమేయము నున్న సనుసరించి సాప్తహము అయితే లాక్షణిక ప్రమేయము ఇది అవుతుంది

(a) real valued and even function of t

t యొక్క వాస్తవ విలువ మరియు పరి ప్రమేయము

(b) real valued and odd function of t

t యొక్క వాస్తవ విలువ మరియు బేసి ప్రమేయము

(c) discontinuous function of t

t యొక్క విచ్చిన్న ప్రమేయము

(d) absolute function of t

t యొక్క పరమ ప్రమేయము

19. If $P(s)$ is the probability generating function for X , the generating function for

$\frac{X-a}{b}$ is

$P(s)$ అనేది X యొక్క సంభావ్యతోత్సాధన ప్రమేయము అయితే $\frac{X-a}{b}$ కు ఇది జనక ప్రమేయము

(a) $s^{-a} p(s)$

(b) $s^{-\frac{a}{b}} p(s^{\frac{1}{b}})$

(c) $s p(s^{\frac{1}{b}})$

(d) $s^{-\frac{b}{a}} p(s^{\frac{1}{b}})$

20. In the usual notation $P\{|X - E(X)| < C\} \geq$

పై మామూలు సంకేతాలలో

(a) $\frac{Var(X)}{C}$

(b) $\frac{Var(X)}{C^2}$

(c) $1 - \frac{Var(X)}{C}$

(d) $1 - \frac{Var(X)}{C^2}$

21. If X is a binomial variate with parameters n and p . If $n = 1$, the distribution of X reduces to

X అను ద్విపద చలరాశి వరామితులు n, p లు. $n = 1$ అయితే, X యొక్క విభాజనము ఈ విభాజనమునకు సమానము

(a) Poisson distribution
పాయిజాన్ విభాజనము

(b) Discrete uniform distribution
ఎకటూన విభాజనము

(c) Binomial distribution itself
ద్విపద విభాజనమునకే

(d) Bernoulli distribution
బెర్నూలీ విభాజనము

22. For a Poission variate X with parameter λ , the value of β_2 is

λ వరామితిగాగల పాయిజాను చలరాశి X యొక్క β_2 విలువ

(a) $\frac{3}{\lambda} + 1$

(b) $3 + \frac{1}{\lambda}$

(c) $\frac{1}{\lambda}$

(d) $3 - \frac{1}{\lambda}$

23. The mean and variance of a binomial variate X with parameters n and p are 8 and 4. Then $P(X=0) =$

n మరియు p లు వరామితులుగాగల ద్విపద చలరాశి X యొక్క అంకమధ్యము మరియు విస్తృతిలు 8 మరియు 4. అప్పుడు $P(X=0) =$

(a) $\frac{1}{2^8}$

(b) $\frac{1}{2^{16}}$

(c) $\frac{1}{2^4}$

(d) $\frac{1}{2}$

24. This distribution has a variance larger than mean

ఈ విభాజనముకు విస్తృతి, మధ్యమము కంటే ఎక్కువగా కలదు

(a) Negative binomial
ధనాత్మక ద్విపద

(b) Poisson
పాయిజాన్

(c) Binomial
ద్విపద

(d) Cauchy
క్యూషి

25. Hyper geometric distribution tends to binomial distribution as
ప్రైవరు జ్ఞానితీయ విభాజనము ద్విపద విభాజనమునకు చేరుటకు నియమాలు ఇవి

(a) $N \rightarrow \infty; p = \frac{M}{N}$

(b) $M \rightarrow \infty; p = \frac{N}{M}$

(c) $N \rightarrow \infty; p = \frac{N}{M}$

(d) $M \rightarrow \infty; p = \frac{M}{N}$

26. Normal distribution is
నార్మల్ విభాజనము

(a) Positively skewed
ధనాత్మక అస్థాష్టవము

(b) Symmetrical
స్థాష్టవము

(c) Negatively skewed
బుఱాత్మక అస్థాష్టవము

(d) Discrete
విహిస్తుము

27. For a normal distribution $f''(x)$ at $x = \mu \pm \sigma$ is
 $x = \mu \pm \sigma$ వద్ద నార్మల్ విభాజనముకు $f''(x)$

(a) $< \sigma^2$

(b) $> \sigma^2$

(c) $\neq 0$

(d) $\neq \mu$

28. The sum of independent gamma variates is this variate

స్వతంత్ర గామా చలరాశుల మొత్తము ఈ చలరాశి

(a) Normal
నార్మల్

(b) Beta
బీటా

(c) Exponential
ఫూతి

(d) Gamma
గామా

29. If X and Y are two independent gamma variates then $X/(X + Y)$ follows

X మరియు Y అనేవి రెండు స్వతంత్ర గామా చలరాశులు అయినప్పుడు $X/(X + Y)$ అనేది ఈ

విభాజనాన్ని పాందుతుంది

(a) Beta distribution
బీటా విభాజనము

(b) Normal distribution
నార్మల్ విభాజనము

(c) Exponential distribution
ఫూతి విభాజనము

(d) Gamma distribution
గామా విభాజనము

30. Moment Generating function of exponential distribution

ఫూతి విభాజనము యొక్క ఫూతికోణవదన ప్రమేయము

(a) $\left(1 - \frac{t}{\theta}\right)^{-1}$

(b) $\left(1 - \frac{t}{\theta}\right)$

(c) $\left(1 - \frac{\theta}{t}\right)^{-1}$

(d) $\left(1 - \frac{\theta}{t}\right)$

SECTION B

31. Probable error of the coefficient of correlation is

సహసంబంధ గుణకము యొక్క సంభావ్య దీపము

$$(a) \frac{2}{3} \frac{\sqrt{1-r^2}}{n} \quad (b) \frac{2}{3} \frac{(1-r^2)}{\sqrt{n}} \quad (c) \frac{2}{3} \left(\frac{(1-r)}{n} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (d) \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{(1-r^2)}{n}$$

32. If X and Y are random variables and a, b, c, d are any numbers, $a \neq 0, c \neq 0$ then $r(aX+b, cY+d) =$

X మరియు Y లు యొద్దుచ్చిక చలరాశులు మరియు a, b, c, d లు ఏవేని సంఖ్యలు, $a \neq 0, c \neq 0$

అయితే $r(aX+b, cY+d) =$

$$(a) \frac{ac}{|ac|} r(X, Y) \quad (b) r(X, Y) \quad (c) \frac{ac}{|bd|} r(X, Y) \quad (d) \frac{|ac|}{bc} r(X, Y)$$

33. The two lines of regression coincide when $r =$

r విలువ ఇది అయినప్పుడు రెండు ప్రతిగమన రేఖలు ఏకీభవించును

$$(a) 0.5 \quad (b) 0.75 \quad (c) 0 \quad (d) -1$$

34. Arithmetic mean of the regression coefficients is

ప్రతిగమన గుణాంకముల యొక్క అంకమధ్యము

(a) $< r$	(b) $>$ rank correlation coefficient $>$ కోటి సహసంబంధ గుణకము
(c) $\geq r$	(d) $\geq r^2$

35. The total number of class frequencies of all orders for n attributes is

n గుణములకు అన్ని క్రమముల యొక్క తరగతి పొనఃపుస్యముల మొత్తము సంఖ్య

$$(a) 3^n \quad (b) 2^n \quad (c) 3^{n-1} \quad (d) 2^{n+1}$$

36. If $N = 1000, (A) = 470, (B) = 620$ and $(AB) = 320$, then A and B are

$N = 1000, (A) = 470, (B) = 620$ మరియు $(AB) = 320$ అయితే A మరియు B లు ఇది

కలిగినవి

(a) positively associated ధనాత్మక సాహచర్యము	(b) negatively associated ఋణాత్మక సాహచర్యము
(c) no associated సాహచర్యము లేనివి	(d) cannot say చెప్పలేము

37. This is a large sample property

ఇది బృహత్ ప్రతిరూప ధర్మము

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| (a) unbiasedness
నిష్టాడ్యుక్షత | (b) sufficiency
పర్యవ్హత |
| (c) consistency
నిలకడత | (d) none of these
ఇవేపీకావు |

38. The standard error of \bar{X} when sampling is without replacement is

తిరిగి చేర్చిన ప్రతిరూప గ్రహణ వద్దతిలో \bar{X} యొక్క క్రమదోషము

- | | |
|---|--|
| (a) $\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ | (b) $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ |
| (c) $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \frac{\sigma^2}{n}$ | (d) $\frac{N-n}{N-1} \sqrt{\frac{\sigma}{n}}$ |

39. If the statistic T is sufficient for θ , then this is also sufficient for θ

T సాంఖ్యకము అకు పర్యవ్హమైతే ఇది కూడ అకు పర్యవ్హ మవుతుంది

- | | |
|--|--|
| (a) $T + \theta$ | (b) Any monotonic function of T
T యొక్క ఏదేని ఏకస్వర ప్రమేయము |
| (c) Any function of T
T యొక్క ఏప్రమేయమైనా | (d) None of these
ఇవేపీకావు |

40. Factorization theorem is due to

కారణాంక విభజన సిద్ధాంతము ఉపాధించినది

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (a) Fisher
ఫిషర్ | (b) Karl Pearson
కార్ల్ పియర్సన్ |
| (c) Neymann
నేమాన్ | (d) Legendre
లెజిండర్ |

41. If t is a consistent estimator of θ , then e^t is a consistent estimator of

t అనేది అకు నిలకడ అంచనాధారము అయితే, e^t దినికి నిలకడ అంచనాధారము

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| (a) $\frac{1}{e^\theta}$ | (b) $\frac{1}{\theta}$ | (c) e^θ | (d) e^{θ^2} |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|

42. In $B(n, p)$ this is a consistent unbiased estimator for p

$B(n, p)$ లో p కు ఇది నిలకడ నిష్టార్థిక అంచనాధారము

(a) $\frac{r}{n}$

(b) $\left(\frac{r}{n}\right)^2$

(c) $\frac{r}{n^2}$

(d) $\frac{r^2}{n}$

43. If a sufficient estimator exists, it is a function of this estimator

ఒక పర్యవృత్త అంచనాధారము ఉన్నట్టయితే ఆది ఈ అంచనాధారము యొక్క ప్రమేయము

(a) consistent
నిలకడ

(b) unbiased
నిష్టార్థిక

(c) moment
ఘూతిక

(d) maximum likelihood
గర్హన సంభవతు

44. M.L.E. of σ^2 in $N(M, \sigma^2)$ is

$N(M, \sigma^2)$ లో σ^2 యొక్క గ.సం.అం.

(a) unbiased
నిష్టార్థికం

(b) inconsistent
నిలకడ లేనిది

(c) independent
స్వతంత్రం

(d) biased
ప్రాక్తికం

45. The 99% confidence limits for p are given by

p కు 99% విశ్వసనీయ అంతరము

(a) $p \pm 1.96 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

(b) $p \pm 2.58 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

(c) $p \pm 2.33 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

(d) $p \pm 2.53 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

46. If χ^2 is a Chi-square variate with n degrees of freedom then $\chi^2/2$ is this variate

n స్వతంత్రం కాలంతో χ^2 ఒక క్లైస్టర్ చలరాశి అయితే $\chi^2/2$ అనేది ఒక

(a) Beta variate
బెటా చలరాశి

(b) Gamma variate
గామా చలరాశి

(c) Standard normal variate
ప్రామానిక సామాన్య చలరాశి

(d) None of these
ఇవేటికావు

47. The mode of the Chi-square distribution with n degrees of freedom

n స్వతంత్రాంకాలతో కై స్ప్రెచ్ విభాజనము యొక్క బాహుళకము

(a) $\sqrt{\frac{2}{n}}$

(b) $n - 2$

(c) n

(d) $\sqrt{2n}$

48. Standard error of sample variance for large sample size is

బృహత్ ప్రతిరూప వరిమాణముకు ప్రతిరూప విస్తృతి యొక్క క్రమదోషము

(a) $\frac{2}{n} \sigma^2$

(b) $\sigma^2 \sqrt{\frac{2}{n}}$

(c) $\sigma \sqrt{\frac{2}{n}}$

(d) $\frac{2}{n} \cdot \sigma$

49. Coefficient of mean square contingency is

మాధ్యవర్గ అధినత యొక్క గుణకము

(a) $\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}$

(b) $\frac{\chi^2}{\chi^2 + 1}$

(c) $\sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$

(d) $\sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + 1}}$

50. Students' t is a particular case of

స్క్రడెంటు t దీని యొక్క ప్రత్యేకమైన ఫీతి

(a) χ^2

(b) Normal

నార్మల్

(c) Fisher's t

(d) F

ఫిషర్స్ టీ

51. The second central moment of t is

t యొక్క రెండు కేంద్రియ ఫూతిక

(a) $\frac{1}{n-2}$

(b) $\frac{1}{n(n-2)}$

(c) $\frac{n}{n-2}$

(d) $\frac{n}{2}$

52. Mean of $F(v_1, v_2)$ is

$F(v_1, v_2)$ యొక్క మధ్యమము

(a) $\frac{v_1}{v_1 - 2}$

(b) $\frac{v_1}{v_2 - 2}$

(c) $\frac{v_2}{v_1 - 2}$

(d) $\frac{v_2}{v_2 - 2}$

53. Mode of F distribution is always

F విభాజనము యొక్క బాహుళకము ఎల్లపుడూ

(a) < 2

(b) > 2

(c) > 4

(d) < 1

54. This is the null hypothesis in a Chi-square test
 ఒక కై స్క్రేచరు పరిష్కలో ఇది ప్రాతిపక్షిక పరికల్పన
 (a) $\mu_1 = \mu_2$ (b) $\mu = \mu_0$
 (c) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (d) The attributes are independent
 గుణములు స్వతంత్రాలు

55. Whether a test is one-sided or two-sided depend on this
 ఒక పరిష్క ఏక పార్శ్వ లేదా ద్వి పార్శ్వ అనేది దినొక్క ఆధారపడుతుంది
 (a) Alternative hypothesis (b) Null hypothesis
 ప్రత్యామ్నాయ పరికల్పన
 (c) Simple hypothesis (d) Composite hypothesis
 సరళ పరికల్పన

56. The value that separates the rejection region from the acceptance region is
 యద్దార్థ ప్రాంతము నుండి తిరస్కరించుతాయి వేరుచేయు విలువ ఇది
 (a) Z-value (b) Critical value
 Z-విలువ సందిగ్ధ విలువ
 (c) Probable value (d) None of these
 సంభావ్య విలువ ఇవేషికావు

57. The critical value of Z for a one tailed test and 1% level of significance
 1% సార్టాక్ తా స్థాయి వద్ద ఏక పార్శ్వ పరిష్క Z యొక్క సందిగ్ధ విలువ
 (a) 2.33 (b) 2.58 (c) 1.96 (d) 1.645

58. Paired t-test is applicable when the observations in the two samples are
 జంటల పరిష్క ఉపయోగించుటకు రెండు ప్రతిరూపములోని విలువలు
 (a) independent (b) dependent
 స్వతంత్రాలు అస్వతంత్రాలు
 (c) unequal (d) none of these
 అసమానము ఇవేషికావు

59. The number of runs in the following sequence is
 దిగువ సీక్వెన్సులో రన్ల సంఖ్య
 A B B A A A B A B B
 (a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 5

60. The test for testing the equality of variances is
 విస్తరించుటకు ఉపయోగించే పరిష్క
 (a) Z (b) t (c) F (d) χ^2

SECTION C

61. The total number of all possible samples of size 2 from a population of five units is

5 యూనిట్లు ఉన్న లోకము నుండి 2 వరిమాణముగల మొత్తము సాధ్యమైన ప్రతి రూపాల సంఖ్య

- (a) 10 (b) 5 (c) 15 (d) 12

62. The number of ways of estimating variances for sample size determinations is
ప్రతిరూప వరిమాణము నిర్దయించుటకు విస్తృతిలో అంచనా వేసి పద్ధతుల సంఖ్య

- (a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3

63. An unbiased estimate of the variance of the sample mean in s.r.s. is
స.యా.ప్ర.లో ప్రతిరూప మధ్యమము యొక్క విస్తృతికు ఒక నిష్టార్థిక అంచనా ఇది

- (a) $\frac{N S^2}{n} (1-f)$ (b) $\frac{N^2 S^2}{n} (1-f)$ (c) $\frac{S^2}{n} (1-f)$ (d) $\frac{S^2}{n^2} (1-f)$

64. $V(\bar{y})_{\text{answer}} = C \cdot V(\bar{y})_{\text{error}}$, where C is

$V(\bar{y})_{\text{error}} = C \cdot V(\bar{y})_{\text{error}}$, C అనేది

- (a) $\frac{N-n}{N-1}$ (b) $\frac{N-n}{N}$ (c) $\frac{N-1}{n-1}$ (d) $\frac{N-1}{N-n}$

65. If the sampling fraction are negligible in all stratum $V(\bar{y}_{st}) =$

అన్ని స్ట్రాటలలో ప్రతిరూప భీనుము ఉప్పేక్షించినట్లుయితి

- (a) $\sum W_n^2 S_n^2 / n_n$ (b) $\sum W_n S_n^2 / n_n$
(c) $\sum W_n S_n / n_n$ (d) $\sum W_n^2 S_n / n_n$

66. This is the finite population correction

ఇది వరిమితులోకపు వవరణ

- (a) $\frac{N-1}{n}$ (b) $\frac{N-n}{N}$ (c) $\frac{N}{n}-1$ (d) $1 - \frac{N}{n}$

67. The probability of drawing a s.r.s. of size n is

n వరిమాణముకల ఒక స.యా.ప్రతిసే సంభావ్యత

- (a) $\frac{n}{N}$ (b) $\frac{1}{N}$ (c) $\frac{1}{NC_n}$ (d) $\frac{N}{NC_n}$

68. Optimum allocation in stratified sampling is

స్టరిట ప్రతిరూపములో అభిలషణాయితా వంపిణీ ఇది

(a) $\frac{n}{N} \cdot N_n$

(b) $\frac{N_n W_n}{N-1}$

(c) $\frac{W_n S_n}{N-1}$

(d) $\frac{W_n S_n}{\sum W_n S_n}$

69. In the usual notation, this is true

మామూలు సంకేతాలలో ఇది వాస్తవము

(a) $V_{ran} \geq V_{prop} \geq V_{opt}$

(b) $V_{prop} \geq V_{opt} \geq V_{ran}$

(c) $V_{ran} \leq V_{prop} \leq V_{opt}$

(d) $V_{prop} \geq V_{ran} \leq V_{opt}$

70. A systematic sample has the same precision as the corresponding stratified sample with one unit per stratum if

ఇది అయితే ఒక క్రమానుగత ప్రతిరూపము స్టరానికి ఒక యూనిట్లో అనుగుణముగా ఉండే స్టరిట ప్రతిరూప సునిశితత్వమే కలిగి ఉంటుంది

(a) $\rho_{west} > 0$

(b) $\rho_{west} = 0$

(c) $\rho_{west} < 0$

(d) None of these

ఇవేంకావు

71. An experimental design is

ఒక ప్రయోగ రచన అనగా

(a) a map

(b) a field

ఒక పటము

ఒక క్షేత్రము

(c) a plan of experiment

(d) an architect

ఒక ప్రయోగానికి ప్రణాళిక

ఒక నిర్మాత

72. The amount of information of a design is

ఒక రచనలోని మొత్తము సమాచారము

(a) $Var(\bar{x})$

(b) $\frac{1}{\sigma^2}$

(c) $1.96 \sqrt{Var(\bar{x})}$

(d) $\frac{1}{Var(\bar{x})}$

73. Randomization is a process in which the treatments are allocated to the experimental units

యాదృచ్ఛికరణ అనే ప్రక్రియలో ఉపచారాలను ప్రయోగ యూనిట్లకు కేటాయించుటకు ఈ క్రింది దానిని వాడుదురు

- | | |
|--|--------------------------------|
| (a) with equal probability
సమాన సంభావ్యతతో | (b) in a sequence
చరుసగా |
| (c) at the will of the investigator
శాస్త్రకుడి ఇష్టం | (d) none of these
ఇవేషీకావు |

74. Completely randomized designs are used when

సంఘర్ష యాదృచ్ఛికీకృత ప్రయోగ రచనలు ఇవ్వుడు ఉపయోగిస్తారు

- | |
|---|
| (a) Some units are likely to fail to respond
కొన్ని ప్రయోగమూలికల నుండి స్పందన బహుళ చాలినంత స్పందన లేనప్పుడు |
| (b) all experimental units are homogeneous
ప్రయోగ మూలికలు సహాతీయమైనప్పుడు |
| (c) the units are likely to be destroyed during experimentation
ప్రయోగ కాలములో ప్రయోగ మూలికలు విధ్వంసంకా బోపునప్పుడు |
| (d) all the above
స్పందర్థాలలో |

75. In field experimentation this design is rarely used

క్లైతు ప్రయోగాలలో ఈ రచనా అరుదుగా ఉపయోగిస్తారు

- | | |
|---------|------------------------------------|
| (a) LSD | (b) RBD |
| (c) CRD | (d) None of the above
ఇవేషీకావు |

76. Fair field Smith's variance law

ఔరి ఫీల్డ్ స్మిత్ యొక్క విస్తృతి ధర్మము

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (a) $x^b = \frac{V_1}{V}$ | (b) $V_x = \frac{V_1}{x^b}$ |
| (c) $V_x = \frac{V_1}{x}$ | (d) $x = \frac{V_1^b}{V}$ |

77. Efficiency of an RBD relative to CRD with 3 replications and 4 treatments is
 CRD కు 3 పునరావృత్తాలు మరియు 4 ఉపచారాలతో ఉన్న RBD యొక్క సాపేక్ష సాధ్యము

(a) $\frac{2}{11} + \frac{12 S_B^2}{11 S_E^2}$

(b) $\frac{1}{11} + \frac{2 S_B^2}{12 S_E^2}$

(c) $1 + \frac{2}{13} \frac{S_B^2}{S_E^2}$

(d) $\frac{12}{11} + \frac{2 S_B^2}{11 S_E^2}$

78. In a randomised block design with 5 treatments and 8 blocks error degrees of freedom is

5 ఏకిత్వాలు మరియు 8 ఖండములు గల యాదృచ్ఛిక ఖండరచనలో దోషము యొక్క స్వాతంత్రయంకాలు

(a) 28

(b) 39

(c) 48

(d) 11

79. In a (3×3) LSD the number of degrees of freedom due to error is

(3×3) LSD లో దోషము యొక్క స్వాతంత్రయంకాల సంఖ్య

(a) 2

(b) 3

(c) 6

(d) 4

80. Estimate of a missing value in an $(m \times m)$ LSD is

$(m \times m)$ LSD లో లోపించిన విలువ యొక్క అశంక

(a) $\frac{m(R + C + T) - S}{(m - 1)(m - 2)}$

(b) $\frac{m(R + C + T) - 2S}{(m - 1)(m - 2)}$

(c) $\frac{(R + C + T) - 2S}{(m - 1)(m - 2)}$

(d) $\frac{m(R + C + T) - 2}{(m - 1)(m - 2)}$

81. These fluctuations are not periodic

ఈ చాంచల్యాలు ఆవర్తనమునకు చెందనివి

(a) seasonal

(b) random

బుటు

యాదృచ్ఛిక

(c) episodic

(d) cyclic

ఉపాధ్యాన

చక్రియ

82. The equal relative change in the variable is assumed for each time period in this trend

ఈ ప్రవృత్తిలో చలరాశిలో సమానమైన సాపేక్ష మార్పు ఉంటుందని ఉపకల్పన

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) quad-ratic | (b) linear |
| బ్యాండ్రాటిక్ | ఎక్సప్రెస్ |
| (c) exponential | (d) none of these |
| ఎక్సప్పొర్ట్ | ఇవెంటికాపు |

83. Method of curve fitting is useful to find

వక్ర సంధాన పద్ధతి దీనిని కనుగొనుటకు ఉపయోగపడుతుంది

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (a) seasonal variation | (b) trend |
| బుటుపులవల్ల వచ్చు విచలనం | ప్రవృత్తి |
| (c) random error | (d) cyclical variation |
| యాదృచ్ఛిక ద్వాం | ప్రక్రియ విచలనం |

84. This method is based on the assumption that seasonal variation for any given month is constant factor of the trend

ఇచ్చిన ఏదేని మాసమునకు బుటుపుల విచలనం ప్రవృత్తి యొక్క ఫ్రైర కారణాంకము అనే ఉపకల్పన మీద ఈ పద్ధతి అధారపడింది

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (a) simple averages | (b) link relative |
| సరళ సగటులు | లింకు సాపేక్ష |
| (c) ratio-to-trend | (d) all the above |
| ప్రవృత్తి నిష్పత్తి | ప్రవృత్తి |

85. The output of many industries display this kind of trend

చాలా పరిశ్రమల యొక్క అనుభవపువు ఈ రకమైన ప్రవృత్తి మార్పుతుంది

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (a) Logistic | (b) Linear |
| లాజిస్టిక్ | ఎక్సప్పొర్ట్ |
| (c) Parabolic | (d) None of the above |
| పరాబాలియు | ఇవెంటికాపు |

86. In this method the relative importance of various commodities neglecter

ఆనేక వస్తువుల యొక్క సాపేక్ష ప్రాముఖ్యమును ఈ పద్ధతిలో అశర్ధ చేయబడుతుంది

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (a) Fixed weight | (b) Simple aggregate |
| ఫ్రైర భార | సరళ సగటు |
| (c) Weighted relatives | (d) None of the above |
| భార సాపేక్షాలు | ఇవెంటికాపు |

ధర సాప్కు కాల మాధ్యమము కొరకు ఉపయోగించే సగటు

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| (a) Harmonic mean
హరార్మీక సగటు | (b) Mode
బహుశకము |
| (c) Arithmetic mean
అంకమధ్యమము | (d) Median
మధ్యగతము |

88. Unit test is not satisfied by this index number

ఈ సూచి సంఖ్య యూనిట్ పరిష్కార రూపైపరవదు

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (a) Laspeyres
లాస్పెయర్ యొక్క | (b) Paasche's
పాష్చె యొక్క |
| (c) Fisher's
ఫిషర్ యొక్క | (d) Price
ధర |

89. In chain index numbers base year is

గొలుసు సూచి సంఖ్యలో ఆధార సంవత్సరము

- | |
|---|
| (a) Changing from year to year
ప్రతి సంవత్సరము మార్పు చెందుతుంది |
| (b) No base year
ఆధార సంవత్సరము లేదు |
| (c) Fixed for all years
అన్ని సంవత్సరములకూ ఒకటి గానే నిర్దారించబడును |
| (d) None of the above
ప్రాప్తికావు |

90. A technique of converting a series of values calculated at current prices into constant prices of a given year

ప్రస్తుత ధరల వాళ్ళ గణించిన విలువల యొక్క ఒక స్రేణిని ఇచ్చిన సంవత్సరము యొక్క ఫీర ధరలలోకి మార్చు పరుతి

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) Base shifting
ఆధారమును మార్చు | (b) Splicing
యమార్పు ఆధారము |
| (c) Deflating
పత్యుల్పించు | (d) Cost of living index
జీవన ప్రమాణ సూచిక |

91. Following is not suitable for comparing mortality in two places

రెండు ప్రదేశాలలో మర్గతను పోల్చుటకు ఇది సరి అయినది కాదు

(a) S.D.R.

(b) A.S.D.R.

(c) C.D.R.

(d) Sex ratio

లింగ నిష్పత్తి

92. A demerit of SDR is

SDR యొక్క ఒక అవలక్షణము ఇది

(a) it uses same set of weights

అదే భారాల సమితిని ఉపయోగించును

(b) it is ratio

అది ఒక నిష్పత్తి

(c) it gives migration statistics

అది వలన సాంఖ్యకాలు ఇచ్చును

(d) it ignores differential mortality

అవకలన మర్గతను విస్మరించును

93. $l_{x+1} =$

(a) $l_x \cdot p_x$

(b) $l_x \cdot q_x$

(c) $l_x + d_x$

(d) $l_x(q_x - 1)$

94. Complete life table can be constructed if we know these values

సంపూర్ణ జీవన చట్టికను ఈ వియవలు తెలిసినట్లయితే నిర్మించగలము

(a) (q_x, p_x)

(b) (l_0, q_x)

(c) (q_x, d_x)

(d) (l_x, q_0)

95. $\frac{dl_x}{dx}$

(a) > 0

(b) $= 0$

(c) ≤ 0

(d) does not exist

ఉత్పన్నమవ్వదు

96. In the usual notation, Pareto's law of distribution of income

మామూలు సంకేతాలలో పారెటో యొక్క అదాయ విభాజనము

(a) $(x - a)^v$

(b) $A(x - a)^v$

(c) $(x - a)^{-v}$

(d) $A(x - a)^{-v}$

97. A measure of the difference between distributions ρ varies from

విభాజనముల మధ్య తేడాను గణించే ρ మార్గు

(a) 0 to 1

(b) -1 to 0

(c) -1 to 1

(d) None of the above

ప్రపాఠికాలు

98. The number of methods of estimating demand function is

డైమాండు ప్రమేయమును అంచనా వేసే పద్ధతుల సంఖ్య ఎది

(a) 2

(b) 4

(c) 3

(d) 1

99. For this value of x the elasticity of demand for the demand function $P = 3 - 5x^2$ is unity

x యొక్క ఈ విలువకు డైమాండు ప్రమేయము $P = 3 - 5x^2$ యొక్క డైమాండు వ్యక్తచత్వం ఒకటి అవుతుంది

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(d) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

100. Price elasticity of supply is positive since price and supply change

ధర మరియు స్పష్ట ఈ మార్గు వలన ధర-స్పష్ట వ్యక్తచత్వం బుఱాత్మకం

(a) in opposite direction

(b) not relevant

వృత్తిరేక దిశలలో

సంబంధము లేదు

(c) constant

(d) in same direction

ఫీరాంకము

ఒకే దిశలో